

胆道癌 No.1	S-1(2投1休)+ GEM(day1,8)療法
胆道癌 No.2	S-1(4投2休)+ GEM(day8,15,22)療法
胆道癌 No.3	GEM(2投1休)療法
胆道癌 No.4	GC療法

胆道癌 No. 1		S-1 (2投1休) + GEM (day1, 8) 療法	
1クール 3週間		標準施行回数 : 有効時継続	
Rp	補液 (名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
1	生理食塩液 100mL	デカトロン3.3mg 2A	30分
2	生理食塩液 100mL	ジェムザール 1000 mg/m ²	30分
3	生理食塩液 50mL	フラッシュ用	適宜
	<TS-1投与量> 1.25m ² 未満 80mg/day 1.25m ² 以上～1.5m ² 未満 100mg/day		

胆道癌 No. 2		S-1 (4投2休) + GEM (day8, 15, 22) 療法	
1クール 6週間		標準施行回数 : 有効時継続	
Rp	補液 (名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
1	生理食塩液 100mL	テカトロン3.3mg 2A	30分
2	生理食塩液 100mL	ジエムザール 1000 mg/m ²	30分
3	生理食塩液 50mL	フラッシュ用	適宜
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <TS-1投与量> 1.25m²未満 80mg/day 1.25m²以上～1.5m²未満 100mg/day </div>		

胆道癌 No. 3		GEM (2投1休) 療法	
1クール 21 日間		標準施行回数 : 有効時継続	
Rp	補液 (名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
1	生理食塩液 100mL	デカトロン3.3mg 2A	30分
2	生理食塩液 100mL	ジエムサール 1000 mg/m ²	30分
3	生理食塩液 50mL	フラッシュ用	適宜

胆道癌 No. 4		GC 療法	
1クール 3週間		標準施行回数 : 有効時継続	
Rp	補液 (名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
1	ルネム3A 1000mL		3時間 (メイン)
2	生理食塩液 100mL	カイトリル 1A + テカトロン3.3mg 2A	30分 (側管)
3	生理食塩液 250mL	シスプラチン 25mg/m ²	60分 (側管)
4	生理食塩液 100mL	ジエムザール 1000 mg/m ²	30分 (側管)