

食道癌 No.1	FP 療法
食道癌 No.2	Low dose FP 療法(FLDP)RT併用
食道癌 No.3	3w-DTX 療法
食道癌 No.4	オプジーボ 療法(240mg固定用量)

食道癌 No. 1		FP 療法	
1 クール 28 日間		標準施行回数 : 2コース	
Rp	補液 (名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
<前日>			
1	ソルデム 3A 2000mL		
<1日目>			
1	生理食塩液 250mL	プロイメント 1V + カトリル 1A + テカドロン 3.3mg 3A (前日のリバーサイド側管から投与)	33分 ホソフ 使用 450mL/h (側管)
2	生理食塩液 50mL	フラッシュ + プレメディ時間調整用	30分 (側管)
3	生理食塩液 500mL	シスプロラシン 80mg/m ² (シスプロラシン開始後5-FU同時投与可)	2時間 (側管)
4	ソルラクト 1000mL	5-FU 800mg/m ² (プロイメントと配合禁)	24時間 (メイン)
5	ソルラクト 1000mL	(シスプロラシン終了後)	4時間 (側管)
6	マンニットール20% 300mL	(シスプロラシン終了後ソルラクトと同時に)	2時間 (側管)
<2日目>			
1	生理食塩液 50mL	カトリル 1A + テカドロン 3.3mg 2A	30分 (側管)
2	ソルラクト 1000mL	5-FU 800mg/m ²	24時間 (メイン)
3	ソルラクト 1000mL		4時間 (側管)
<3~5日目>			
1	ソルラクト 1000mL	5-FU 800mg/m ²	24時間 (メイン)
2	ソルラクト 1000mL		4時間 (側管)
<6日目終了時>			
1	生理食塩液 50mL		フラッシュ用

食道癌 No. 2		Low dose FP 療法 (FLDP) RT併用	
1 クール 7 日間		標準施行回数 : 6 クール	
Rp	補液 (名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
<1~5日>			
1	生理食塩液 50mL	血管確保用	15分 (メイン)
2	ソルラクト 1000mL	5-FU 200 mg/m ²	24時間 (メイン)
3	生理食塩液 250mL	シスプラチニン 4 mg/m ²	1時間 (側管)
4	生理食塩液 50mL		フラッシュ用 (最終日)

食道癌 No. 3		3w-DTX 療法	
1 クール 21 日間		標準施行回数 : 有効時継続	
Rp	補液（名称・用量）	薬剤名・用量	投与速度等
1	生理食塩液 100mL	テガドロン 3.3mg 2A	30分
2	生理食塩液 250mL	ドセタキセル 70 mg/m ²	1時間

切除不能進行・再発食道癌 No. 4		オプジーボ 療法(240mg固定用量)	
1 ケール 14 日間		標準施行回数 : 有効時継続	
Rp	補液(名称・用量)	薬剤名・用量	投与速度等
1	生理食塩液 50mL	血管確保用	20分
2	生理食塩液 50mL	オプジーボ 240 mg/body	30分
3	生理食塩液 50mL	フラッシュ用	適宜