

## CT 検査を受ける方へ

- \* 予約時間を厳守するようご協力お願いします。
- \* 検査時間は通常 CT で約 10 分、造影 CT で約 20 分です。
- \* 緊急の患者様への対応のため撮影順が変わることがありますのでご了承ください。
- \* 都合が悪く来院出来なくなった場合は、できるだけ早く受診された科の外来窓口までご連絡をお願いいたします。

## 注意事項

CT 検査は放射線を使用するため以下のような方は検査を受けられない場合があります。該当される方は主治医またはスタッフにお申し出ください。

- ・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある
- ・心臓ペースメーカー、除細動器を使用している
- ・糖尿病患者向けグルコース測定器（例：リブレ）を付けている
- ・1 週間以内にバリウム検査を受けている

## 食事について

検査部位に応じて食事制限があります。主治医からの指示・検査前説明に従ってください。基本的に**腹部 CT** や**造影 CT** では**約 3 時間絶食**していただきます。検査が午前の場合は朝食を、午後の場合は昼食を控えていただきます。水やお茶などの水分は通常通り摂取してください（ただし牛乳やジュースなどは不可）。

※ただし緊急の場合はこの限りではありません。

## 服装について

検査部位に応じて金属類は外していただき、必要に応じて着替えをしていただきます。スタッフの指示に従ってください。

基本的に以下の検査の場合ははずしていただきます。

- ・頭部 CT：帽子、眼鏡、ヘアピン、ネックレス、補聴器、入れ歯、ピアス等
- ・胸部、腹部 CT：ネックレス、ブラジャーなど金属がついた下着、カイロ、エレキバン、ファスナーが着いた洋服、コルセット、ベルト等

## 造影剤について

造影剤を使用することで血管や病変をわかりやすくすることができます。食事制限や休薬などの指示があるため、検査前説明での注意事項をお守りください。

造影剤が注入されると体が少し熱く感じますが、正常反応であるためご心配はいりません。ごくまれに造影剤による副作用が起こることがありますので、熱さ以外に具合が悪い（吐き気、息苦しい）、かゆみや発疹があるなどの場合はすぐにスタッフにお知らせ下さい。また、以下の方は必ず検査前にお申し出ください。

- ・アレルギー体質の方
- ・喘息（小児喘息、気管支喘息、咳喘息、アレルギーを含む）の既往歴がある方
- ・ヨードまたはヨード造影剤のアレルギーがある方
- ・過去の造影検査で副作用がでた方
- ・糖尿病の薬を飲んでいる方

造影剤は尿として体外に排出されるため、検査後は水分を多めに取るようにお願いします。また検査当日は脱水症状を引き起こすような激しい運動やアルコール摂取はお控えください。

まれに帰宅後に造影剤による副作用が起こることがありますので、症状が出た場合は渥美病院（0531-22-2131）までご連絡をお願いします。

被ばく等、放射線について心配や質問がある場合は  
主治医や診療放射線技師にお気軽にご相談ください。

