レジメンオーダ登録確認表

登録NO. 10g　　登録年月日 2015/1/1

	診療科	氏名	印	がん種	レジメン名称（略号）
確認	内科	部長：吉田　昌弘		非小細胞肺癌	ＶＮＢ
作成／確認	薬剤部	藤井友和／西川隆一・辻博幸	/	１クール　２８　日間	標準施行回数　：　有効時継続

薬剤名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ナベルビン	VNB	20 mg/m^2	点滴静注	6～10分		↓							↓							↓							休							↓		

Rp	補液（名称・用量）	薬剤名・用量	投与速度等
1	生理食塩液　50mL	血管確保用	20分
2	生理食塩液　50mL	ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ　20 mg/m^2	6～10分かけて
3	生理食塩液　50mL	ﾌﾗｯｼｭ用	適宜
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

特　記　事　項	
休薬・減量・中止基準	減量・休薬：Grade2以上の血液・非血液毒性 中止：Grade3以上の血液毒性およびGrade3以上の過敏症
主な副作用とその対策	・悪心嘔吐：5HT$_3$拮抗薬+ｽﾃﾛｲﾄﾞの前投薬 ・血管痛：点滴速度を早くする（5～7分）
注意事項	・高齢者では day15を省略した21日サイクルを考慮
主要文献	・LeChevalier T, et al. J Clin Oncol;1994:12: 360-7 ・Gridelli C, et al. J Natl Cancer Inst 2003;95: 362-72