

# レジメンオーダ登録確認表

登録NO. 10h

登録年月日  
2016/10/3

|       | 診療科 | 氏名            | 印 | がん種       | レジメン名称（略号）         |
|-------|-----|---------------|---|-----------|--------------------|
| 確認    | 外科  | 部長：古池 真也      |   | 神経内分泌癌    | CDDP + CPT-11（適応外） |
| 作成／確認 | 薬剤部 | 藤井友和／西川隆一・辻博幸 | / | 1クール 28日間 | 標準施行回数：有効時継続       |

| 薬剤名    | 略号     | 投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|--------|--------|----------------------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| イリノテカン | CPT-11 | 60 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 90分  |     | ↓ |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |  |
| シスプラチン | CDDP   | 60 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 2時間  |     | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ↓  |    |  |
|        |        |                      |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

| Rp         | 補液（名称・用量）         | 薬剤名・用量                     | 投与速度等    |
|------------|-------------------|----------------------------|----------|
| <1日目>      |                   |                            |          |
| 1          | ソルデム3A 1500mL     |                            | 6時間（メイン） |
| 2          | ゲラニセトロン 3mg/100mL | アロカリス 1V + テキサート 3.3mg 3A  | 30分（側管）  |
| 3          | 生理食塩液 50mL        | フラッシュ + プレメディ時間調整用         | 30分（側管）  |
| 4          | 生理食塩液 250mL       | イリノテカン 60mg/m <sup>2</sup> | 90分（側管）  |
| 5          | 生理食塩液 250mL       | シスプラチン 60mg/m <sup>2</sup> | 2時間（側管）  |
| <8日目、15日目> |                   |                            |          |
| 6          | ゲラニセトロン 3mg/100mL | テキサート 3.3mg 2A             | 30分      |
| 7          | 生理食塩液 250mL       | イリノテカン 60mg/m <sup>2</sup> | 90分      |
| 8          | 生理食塩液 50mL        | フラッシュ用                     | 適宜       |
| 10         |                   |                            |          |

| 特記事項       |                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 休薬・減量・中止基準 | 減量・休薬：Grade2以上の血液・非血液毒性<br>中止：Grade3以上の過敏症                                                                                                                                                |
| 主な副作用とその対策 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・悪心嘔吐：NK<sub>1</sub>拮抗薬+5HT<sub>3</sub>拮抗薬+ステロイドの前投薬</li> <li>・腎障害：輸液（2,000mL～3,000mL）</li> <li>・急性下痢：抗コリン薬</li> <li>・遅発性下痢：ロペラミド+半夏瀉心湯</li> </ul> |
| 注意事項       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・遅発性の下痢に対し乳酸菌製剤の投与は避ける</li> <li>・イリノテカンはUGT1A1遺伝子多型の検査結果をもとに投与量を設定すること（*6もしくは*28のホモ接合体および複合ヘテロ接合体の場合は50%に減量し、ヘテロ接合体の場合は70%に減量することを考慮）</li> </ul>   |
| 主要文献       | ・Kulke MH, et al. Dig Dis Sci 2006; 51(6): 1033-38.                                                                                                                                       |

# レジメンオーダ登録確認表

登録NO. 11h

登録年月日  
2016/10/28

|       | 診療科 | 氏名                     | 印 | がん種         | レジメン名称（略号）        |
|-------|-----|------------------------|---|-------------|-------------------|
| 確認    | 外科  | 部長：古池 真也               |   | 神経内分泌癌      | CDDP + VP-16（適応外） |
| 作成／確認 | 薬剤部 | 藤井友和／西川隆一・辻博幸<br>・澤柳直樹 | / | 1クール 2 1 日間 | 標準施行回数：有効時継続      |

| 薬剤名    | 略号    | 投与量                   | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|--------|-------|-----------------------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| エトポシド  | VP-16 | 100 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 2時間  |     | ↓ | ↓ | ↓ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン | CDDP  | 80 mg/m <sup>2</sup>  | 点滴静注 | 2時間  |     | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |       |                       |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Rp        | 補液（名称・用量）         | 薬剤名・用量                     | 投与速度等    |
|-----------|-------------------|----------------------------|----------|
| <1日目>     |                   |                            |          |
| 1         | ソルデム3A 1500mL     |                            | 6時間（メイン） |
| 2         | グラニセトロン 3mg/100mL | 70カリス 1V + デキサト 3.3mg 3A   | 30分（側管）  |
| 3         | 生理食塩液 50mL        | フラッシュ + プレメドイ時間調整用         | 30分（側管）  |
| 4         | 生理食塩液 500mL       | エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> | 2時間（側管）  |
| 5         | 生理食塩液 250mL       | シスプラチン 80mg/m <sup>2</sup> | 2時間（側管）  |
| <2日目、3日目> |                   |                            |          |
| 6         | グラニセトロン 3mg/100mL | デキサト 3.3mg 2A              | 30分（側管）  |
| 7         | 生理食塩液 500mL       | エトポシド 100mg/m <sup>2</sup> | 2時間（側管）  |
| 8         | 生理食塩液 50mL        | フラッシュ用                     | 適宜       |
| 10        |                   |                            |          |

| 特記事項       |                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 休薬・減量・中止基準 | 減量・休薬：Grade2以上の血液・非血液毒性<br>中止：Grade3以上の過敏症                                                                           |
| 主な副作用とその対策 | ・悪心嘔吐：NK <sub>1</sub> 拮抗薬+5HT <sub>3</sub> 拮抗薬+ステロイドの前投薬<br>・腎障害：輸液（2,000mL～3,000mL）                                 |
| 注意事項       | ・エトポシドは溶解時の濃度により析出することがあるので、0.4mg/mL以下の濃度になるよう調製すること<br>・エトポシドの析出までの時間は、0.4mg/mLでは24時間以上だが、0.6mg/mLとなると最短6時間という報告がある |
| 主要文献       | ・Fjallskog ML, et al. Cancer. 2001; 92(5): 1101-1107.<br>British Journal of Cancer (1999) 81(8), 1351-1355           |